

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 94 - Région: CORSE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 482	667	815	545	656	122	159
	55-59 ans	1 346	574	772	380	472	194	300
	60-64 ans	1 533	687	846	383	464	304	382
	65-69 ans	1 305	589	716	325	359	264	357
	70-74 ans	1 149	499	650	262	335	237	315
	50-74 ans	6 815	3 016	3 799	1 895	2 286	1 121	1 513
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	226	107	119	89	100	18	19
	55-59 ans	223	93	130	70	88	23	42
	60-64 ans	235	116	119	62	70	54	49
	65-69 ans	213	103	110	66	56	37	54
	70-74 ans	195	91	104	56	65	35	39
	50-74 ans	1 092	510	582	343	379	167	203
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	116	59	57	47	44	12	13
	55-59 ans	126	56	70	39	44	17	26
	60-64 ans	131	67	64	28	29	39	35
	65-69 ans	139	68	71	41	30	27	41
	70-74 ans	118	57	61	33	33	24	28
	50-74 ans	630	307	323	188	180	119	143
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	110	48	62	42	56	6	6
	55-59 ans	97	37	60	31	44	6	16
	60-64 ans	104	49	55	34	41	15	14
	65-69 ans	74	35	39	25	26	10	13
	70-74 ans	77	34	43	23	32	11	11
	50-74 ans	462	203	259	155	199	48	60
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 372	619	753	503	600	116	153
	55-59 ans	1 249	537	712	349	428	188	284
	60-64 ans	1 429	638	791	349	423	289	368
	65-69 ans	1 231	554	677	300	333	254	344
	70-74 ans	1 072	465	607	239	303	226	304
	50-74 ans	6 353	2 813	3 540	1 740	2 087	1 073	1 453
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	25	12	13	9	12	3	1
	55-59 ans	19	9	10	6	9	3	1
	60-64 ans	36	18	18	15	13	3	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 94 - Région: CORSE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	26	16	10	12	3	4	7
	70-74 ans	32	14	18	7	9	7	9
	50-74 ans	138	69	69	49	46	20	23
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	25	12	13	9	12	3	1
	55-59 ans	19	9	10	6	9	3	1
	60-64 ans	36	18	18	15	13	3	5
	65-69 ans	26	16	10	12	3	4	7
	70-74 ans	32	14	18	7	9	7	9
	50-74 ans	138	69	69	49	46	20	23
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	1	3	1	0
	60-64 ans	7	4	3	3	2	1	1
	65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
	70-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
	50-74 ans	28	15	13	10	7	5	6
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	5	2	3	1	3	1	0
	60-64 ans	7	4	3	3	2	1	1
	65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
	70-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
	50-74 ans	27	15	12	10	6	5	6
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	5	2	3	1	3	1	0
	60-64 ans	7	4	3	3	2	1	1
	65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
	70-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
	50-74 ans	27	15	12	10	6	5	6
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 94 - Région: CORSE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	15,2	16,0	14,6	16,3	15,2	14,8	11,9
	55-59 ans	16,6	16,2	16,8	18,4	18,6	11,9	14,0
	60-64 ans	15,3	16,9	14,1	16,2	15,1	17,8	12,8
	65-69 ans	16,3	17,5	15,4	20,3	15,6	14,0	15,1
	70-74 ans	17,0	18,2	16,0	21,4	19,4	14,8	12,4
	50-74 ans	16,0	16,9	15,3	18,1	16,6	14,9	13,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	7,4	7,2	7,6	7,7	8,5	4,9	3,8
	55-59 ans	7,2	6,4	7,8	8,2	9,3	3,1	5,3
	60-64 ans	6,8	7,1	6,5	8,9	8,8	4,9	3,7
	65-69 ans	5,7	5,9	5,4	7,7	7,2	3,8	3,6
	70-74 ans	6,7	6,8	6,6	8,8	9,6	4,6	3,5
	50-74 ans	6,8	6,7	6,8	8,2	8,7	4,3	4,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	51,3	55,1	47,9	52,8	44,0	66,7	68,4
	55-59 ans	56,5	60,2	53,8	55,7	50,0	73,9	61,9
	60-64 ans	55,7	57,8	53,8	45,2	41,4	72,2	71,4
	65-69 ans	65,3	66,0	64,5	62,1	53,6	73,0	75,9
	70-74 ans	60,5	62,6	58,7	58,9	50,8	68,6	71,8
	50-74 ans	57,7	60,2	55,5	54,8	47,5	71,3	70,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	1,9	1,7	1,8	2,0	2,6	0,7
	55-59 ans	1,5	1,7	1,4	1,7	2,1	1,6	0,4
	60-64 ans	2,5	2,8	2,3	4,3	3,1	1,0	1,4
	65-69 ans	2,1	2,9	1,5	4,0	0,9	1,6	2,0
	70-74 ans	3,0	3,0	3,0	2,9	3,0	3,1	3,0
	50-74 ans	2,2	2,5	1,9	2,8	2,2	1,9	1,6
50-74 ans **	2,1	2,3	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 94 - Région: CORSE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	16,0	25,0	7,7	22,2	8,3	33,3	0,0
	55-59 ans	26,3	22,2	30,0	16,7	33,3	33,3	0,0
	60-64 ans	19,4	22,2	16,7	20,0	15,4	33,3	20,0
	65-69 ans	15,4	6,3	30,0	8,3	0,0	0,0	42,9
	70-74 ans	25,0	35,7	16,7	42,9	11,1	28,6	22,2
	50-74 ans	20,3	21,7	18,8	20,4	15,2	25,0	26,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	75,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	96,4	100,0	92,3	100,0	85,7	100,0	100,0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)